

§1. Аффинная плоскость

1.1. Векторные пространства. Фиксируем произвольное поле¹ \mathbb{k} , элементы которого будем называть числами или скалярами. Множество V , элементы которого мы будем называть векторами², является векторным пространством над полем \mathbb{k} , если на V определены операция сложения векторов, сопоставляющая каждой паре векторов $v_1, v_2 \in V$ их сумму $v_1 + v_2 \in V$, и операция умножения векторов на числа, сопоставляющая каждому вектору $v \in V$ и скаляру $\lambda \in \mathbb{k}$ вектор $\lambda \cdot v = v \cdot \lambda \in V$ так, что выполняются следующие аксиомы.

1. Свойства сложения векторов:

(1а) $a + b = b + a$ для всех $a, b \in V$ (см. рис. 1◊1)

(1б) $a + (b + c) = (a + b) + c$ для всех $a, b, c \in V$ (см. рис. 1◊2)

(1в) имеется такой нулевой вектор $0 \in V$, что $a + 0 = a$ для всех $a \in V$

(1г) у каждого вектора $a \in V$ есть противоположный вектор $-a \in V$, такой что $a + (-a) = 0$.




Рис. 1◊1. Правило параллелограмма.




Рис. 1◊2. Правило четырёхугольника.

2. Свойства умножения векторов на числа:

(2а) $\lambda(\mu a) = (\lambda\mu)a$ для всех $a \in V$ и $\lambda, \mu \in \mathbb{k}$

(2б) $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$ для всех $a \in V$ и $\lambda, \mu \in \mathbb{k}$

(2в) $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$ для всех $a, b \in V$ и $\lambda \in \mathbb{k}$

(2г) $1 \cdot a = a$ для всех $a \in V$

Подмножество U векторного пространства V называется *векторным подпространством*, если для любых двух векторов $u, w \in U$ все их линейные комбинации $\lambda u + \mu w$ с произвольными $\lambda, \mu \in \mathbb{k}$ тоже лежат в U . Из написанных аксиом формально вытекает ещё несколько интуитивно ожидаемых свойств операций над векторами.

¹Точное определение поля будет дано в курсе алгебры (см., например, лекцию <http://gorod.bogomolov-lab.ru/ps/stud/algebra-1/1314/lec-02.pdf>).

²Векторы продуктивно представлять себе как направленные отрезки, рассматриваемые с точностью до параллельного переноса.

ЛЕММА 1.1

В каждом векторном пространстве V нулевой вектор $0 \in V$ единствен. Для любого $a \in V$ противоположный к a вектор $-a$ однозначно определяется по a . Кроме того, $0 \cdot a = 0$ и $(-1) \cdot a = -a$, где 0 и -1 в левых частях равенств суть числа из поля \mathbb{k} , а 0 и $-a$ в правых — векторы из пространства V . Аналогично, $\lambda \cdot 0 = 0$ для всех $\lambda \in \mathbb{k}$, где $0 \in V$ — нулевой вектор.

Доказательство. Для любых двух нулевых векторов $0_1, 0_2 \in V$ по аксиоме (1в) выполняется равенство $0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2$. Если векторы b и c оба противоположны к a , то $b = b + 0 = b + (a + c) = (b + a) + c = 0 + c = c$. Если к левой и правой частям равенства

$$a + 0 \cdot a = 1 \cdot a + 0 \cdot a = (1 + 0) \cdot a = 1 \cdot a = a$$

прибавить противоположный к a вектор $-a$, мы получим $0 \cdot a = 0$. Аналогично, прибавляя к обеим частям равенства $\lambda \cdot 0 = \lambda \cdot (0 + 0) = \lambda \cdot 0 + \lambda \cdot 0$ вектор, противоположный вектору $\lambda \cdot 0$, получаем $0 = \lambda \cdot 0$. Вектор $(-1) \cdot a$ противоположен к a , поскольку $a + (-1) \cdot a = 1 \cdot a + (-1) \cdot a = (1 - 1) \cdot a = 0 \cdot a = 0$. \square

ПРИМЕР 1.1

Простейшие примеры векторных пространств суть *нулевое* или *тривиальное пространство* 0 , состоящее из одного лишь нулевого вектора 0 , такого что $0 + 0 = 0 = -0$ и $\lambda \cdot 0 = 0$ для всех $\lambda \in \mathbb{k}$, а также само поле \mathbb{k} , где сложение векторов и их умножение на числа суть сложение и умножение, которые имеются в поле \mathbb{k} .

ПРИМЕР 1.2 (n -МЕРНОЕ КООРДИНАТНОЕ ПРОСТРАНСТВО \mathbb{k}^n)

По определению, векторами пространства \mathbb{k}^n являются упорядоченные наборы из n чисел¹

$$(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad x_i \in \mathbb{k}.$$

Сложение векторов и их умножение на числа задаются правилами

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) \stackrel{\text{def}}{=} (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \\ \lambda \cdot (x_1, x_2, \dots, x_n) \stackrel{\text{def}}{=} (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n).$$

ПРИМЕР 1.3 (ПРОСТРАНСТВО МНОГОЧЛЕНОВ)

Многочлены с коэффициентами в поле \mathbb{k} образуют векторное пространство над \mathbb{k} относительно операций сложения многочленов и умножения их на константы. Это пространство обозначается $\mathbb{k}[x]$. Многочлены степени не выше n образуют в $\mathbb{k}[x]$ векторное подпространство, которое мы будем обозначать $\mathbb{k}[x]_{\leq n}$.

1.1.1. Линейные отображения. Отображение $F : U \rightarrow W$ из векторного пространства U в векторное пространство W называется *линейным*, если оно перестановочно со сложением векторов и их умножением на числа в том смысле, что $F(\alpha a + \beta b) = \alpha F(a) + \beta F(b)$ для всех $a, b \in U$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{k}$. Векторные пространства, между которыми имеется взаимно однозначное линейное отображение, называются *изоморфными*, а само это отображение называется *изоморфизмом* векторных пространств. Изоморфизмы $V \simeq V$ пространства с самим собою называются *автоморфизмами*. Автоморфизмы векторного пространства V образуют *группу преобразований*². Эта группа обозначается $GL(V)$ и называется *полной линейной группой* векторного пространства V .

¹Для экономии бумаги мы пишем их в строчку, но иногда бывает удобно представлять векторы пространства \mathbb{k}^n и в виде столбцов.

²См. стр. 5.

ПРИМЕР 1.4

Пространство $\mathbb{k}[x]_{\leq n}$ многочленов степени не выше n изоморфно $(n + 1)$ -мерному координатному пространству \mathbb{k}^{n+1} посредством линейного биективного отображения, сопоставляющего многочлену $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ набор его коэффициентов $(a_0, a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{k}^{n+1}$.

Предостережение 1.1. Обратите внимание, что отображение $\varphi : \mathbb{k} \rightarrow \mathbb{k}$, заданное формулой $\varphi(x) = a \cdot x + b$, которое в школе принято называть «линейной функцией», линейно в смысле п° 1.1.1 только при $b = 0$. Если же $b \neq 0$, то $\varphi(\lambda x) \neq \lambda\varphi(x)$ и $\varphi(x + y) \neq \varphi(x) + \varphi(y)$, т. е. φ не является линейным отображением.

Упражнение 1.1. Докажите для любого линейного отображения F равенства $F(0) = 0$ и $F(-v) = -F(v)$ для всех $v \in V$.

1.1.2. Пропорциональные векторы и одномерные пространства. Векторы a и b из векторного пространства V называются *пропорциональными*, если $x \cdot a = y \cdot b$ для некоторых чисел $x, y \in \mathbb{k}$, не равных одновременно нулю. Таким образом, нулевой вектор пропорционален любому вектору, а пропорциональность ненулевых векторов a и b означает, что $a = \lambda b$ и $b = \lambda^{-1}a$ для некоторого ненулевого $\lambda \in \mathbb{k}$.

Векторное пространство V называется *одномерным*, что принято записывать равенством¹ $\dim V = 1$, если в нём есть ненулевые векторы, но все они пропорциональны друг другу. Фиксируя в одномерном пространстве V какой-нибудь ненулевой вектор e , мы можем однозначно записать любой вектор $v \in V$ как $v = xe$ с $x \in \mathbb{k}$. Такое представление единственно, поскольку из равенства $xe = ye$ вытекает, что $(x - y)e = 0$, откуда $x - y = 0$, ибо в противном случае, умножая обе части равенства $(x - y)e = 0$ на число $(x - y)^{-1}$, мы получили бы $e = 0$.

Число x называется *координатой* вектора $v = xe$ относительно *базисного* вектора e . Отображение $V \rightarrow \mathbb{k}$, переводящее каждый вектор $v = xe \in V$ в его координату $x \in \mathbb{k}$ устанавливает изоморфизм между V и \mathbb{k} . При выборе другого базисного вектора $e' = \lambda e$ координата x' каждого вектора $v = x'e' = x'\lambda e = xe$ относительно этого нового базисного вектора связана со старой координатой x соотношением $x' = \lambda^{-1}x$.

Каждое линейное отображение $F : V \rightarrow V$ одномерного пространства V в себя однозначно задаётся тем, куда оно переводит какой-нибудь базисный вектор e пространства V . Если $F(e) = \lambda e$, то для произвольного вектора $v = xe$ получим $F(xe) = xF(e) = \lambda xe$. В частности, эндоморфизм F либо отображает все векторы в нуль, либо является гомотетией с ненулевым коэффициентом $\lambda \in \mathbb{k}$. Таким образом, полная линейная группа $GL(V)$ одномерного пространства V состоит из гомотетий с ненулевыми коэффициентами и изоморфна мультипликативной группе \mathbb{k}^* ненулевых элементов поля \mathbb{k} .

1.2. Двумерное векторное пространство. Векторное пространство V называется *двумерным*, что принято записывать равенством $\dim V = 2$, если в нём есть пара непропорциональных векторов e_1, e_2 , и каждый вектор $v \in V$ выражается через них в виде $v = x_1e_1 + x_2e_2$, где $x_1, x_2 \in \mathbb{k}$. Любая пара векторов e_1, e_2 , обладающая этими двумя свойствами, называется *базисом* пространства V . Коэффициенты x_1, x_2 разложения вектора v по базису *однозначно* определяются вектором v и базисом, поскольку из равенства $x_1e_1 + x_2e_2 = y_1e_1 + y_2e_2$ вытекает равенство $(x_1 - y_1)e_1 = (x_2 - y_2)e_2$, возможное только при $(x_1 - y_1) = (x_2 - y_2) = 0$ в силу того, что

¹Обозначение \dim является сокращением от *dimension* (размерность). В полной общности мы обсудим это понятие в п° 4.1 на стр. 48 ниже.

векторы e_1 и e_2 не пропорциональны. Числа $x_1, x_2 \in \mathbb{k}$ из разложения $v = x_1 e_1 + x_2 e_2$ называются *координатами* вектора v в базисе $e = (e_1, e_2)$. Сопоставляя каждому вектору столбец его координат в базисе e , мы получаем биективное отображение

$$c_e : V \xrightarrow{\cong} \mathbb{k}^2, \quad v = x_1 e_1 + x_2 e_2 \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{k}^2.$$

УПРАЖНЕНИЕ 1.2. Проверьте, что это отображение линейно, т. е. при сложении векторов столбцы их координат складываются, а при умножении на число — умножаются на число по правилам координатного пространства \mathbb{k}^2 .

Таким образом, всякое двумерное векторное пространство V изоморфно координатному пространству \mathbb{k}^2 .

1.2.1. Определитель 2×2 . Пропорциональность векторов $a = (a_1, a_2)$ и $b = (b_1, b_2)$ в \mathbb{k}^2 равносильна равенству перекрёстных произведений $a_1 b_2 = a_2 b_1$. Число

$$\det(a, b) \stackrel{\text{def}}{=} a_1 b_2 - a_2 b_1 \tag{1-1}$$

называется *определителем* векторов $a, b \in \mathbb{k}^2$ или 2×2 -матрицы, составленной из координат этих векторов. В последнем случае определитель записывают как

$$\det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1 = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}$$

Обратите внимание, что неважно, каким образом записаны координаты векторов — по строкам или по столбцам матрицы, поскольку величина (1-1) не меняется при отражении матрицы относительно диагонали, ведущей из левого верхнего угла в правый нижний¹. Очевидно, что для всех векторов $a, b, c \in \mathbb{k}^2$ и чисел $\lambda \in \mathbb{k}$ выполняются равенства

$$\det(a, b) = 0 \iff a \text{ и } b \text{ пропорциональны} \tag{1-2}$$

$$\det(a, b) = -\det(b, a) \tag{1-3}$$

$$\det(\lambda a, b) = \lambda \det(a, b) = \det(a, \lambda b) \tag{1-4}$$

$$\det(a + b, c) = \det(a, c) + \det(b, c) \tag{1-5}$$

$$\det(a, b + c) = \det(a, b) + \det(a, c)$$

УПРАЖНЕНИЕ 1.3. Убедитесь в этом!

Свойство (1-3) называется *знакопеременностью*, (1-4) — *однородностью*, (1-5) — *аддитивностью*. Вместе однородность и аддитивность означают, что определитель *линеен* по каждому из двух своих аргументов, т. е. *билинеен*. Из билинейности вытекает, что для любых векторов $a, b, c, d \in \mathbb{k}^2$ и констант $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{k}$ выполняется то же самое правило раскрытия скобок², что и для произведения чисел:

$$\det(\alpha a + \beta b, \gamma c + \delta d) = \alpha \gamma \det(a, c) + \alpha \delta \det(a, d) + \beta \gamma \det(b, c) + \beta \delta \det(b, d).$$

¹Эта диагональ называется *главной*, а отражение матрицы относительно главной диагонали называется *транспонированием*.

²Это правило называют *дистрибутивностью* или *распределительным законом*.

ЛЕММА 1.2

Каждая пара непропорциональных векторов $a, b \in \mathbb{k}^2$ является базисом. Коэффициенты разложения произвольного вектора $v \in \mathbb{k}^2$ по этому базису вычисляются по *правилу Крамера*:

$$v = x \cdot a + y \cdot b \iff \begin{cases} x = \det(v, b) / \det(a, b) \\ y = \det(a, v) / \det(a, b). \end{cases} \quad (1-6)$$

Доказательство. Если имеется разложение $v = x \cdot a + y \cdot b$, то из билинейности и косимметричности определителя вытекают равенства

$$\begin{aligned} \det(a, v) &= \det(a, x \cdot a + y \cdot b) = x \cdot \det(a, a) + y \cdot \det(a, b) = y \cdot \det(a, b) \\ \det(v, b) &= \det(x \cdot a + y \cdot b, b) = x \cdot \det(a, b) + y \cdot \det(b, b) = x \cdot \det(a, b), \end{aligned}$$

из которых x и y однозначно выражаются в виде (1-6). Для доказательства существования разложения $v = x \cdot a + y \cdot b$ заметим, что разность $v - a \cdot \det(v, b) / \det(a, b)$ пропорциональна вектору b , т. к. $\det(v - a \cdot \det(v, b) / \det(a, b), b) = \det(v, b) - \det(a, b) \cdot \det(v, b) / \det(a, b) = 0$. Поэтому $v = a \cdot \det(v, b) / \det(a, b) + b \cdot y$ для некоторого $y \in \mathbb{k}$. \square

СЛЕДСТВИЕ 1.1

В любом двумерном векторном пространстве любые два непропорциональных вектора образуют его базис. \square

УПРАЖНЕНИЕ 1.4. Пусть вектор v имеет в базисе (u_1, u_2) координаты $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, а векторы u_1 и u_2 , в свою очередь, имеют в некотором другом базисе (w_1, w_2) координаты $u_1 = \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{21} \end{pmatrix}$ и $u_2 = \begin{pmatrix} c_{12} \\ c_{22} \end{pmatrix}$. Найдите координаты вектора v в базисе (w_1, w_2) .

1.3. Площадь ориентированного параллелограмма. Функция $s : V \times V \rightarrow \mathbb{k}$, сопоставляющая каждой упорядоченной паре векторов a, b двумерного векторного пространства V число $s(a, b) \in \mathbb{k}$, называется *площадью ориентированного параллелограмма*, если для любых векторов $a, b \in V$ и чисел $\lambda, \mu \in \mathbb{k}$ выполняются равенства

$$s(a, b + \lambda a) = s(a, b) = s(a + \mu b, b) \quad (1-7)$$

$$s(\lambda a, b) = \lambda s(a, b) = s(a, \lambda b). \quad (1-8)$$

Первое из них означает, что площадь параллелограмма не меняется при параллельном переносе одной из его сторон вдоль самой себя: треугольник, который при этом отрезается, параллельно сдвигается и приклеивается с другой стороны, как на [рис. 1◊3](#).




Рис. 1◊3. Площадь не меняется.




Рис. 1◊4. Ориентированный параллелограмм.

Второе свойство (1-8) утверждает, что при изменении одной из сторон параллелограмма в λ раз площадь также изменяется в λ раз. В частности, $s(-a, b) = -s(a, b) = s(a, -b)$, т. е. площадь *меняет знак* при смене знака одного из векторов. В школьном курсе геометрии над полем $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ принято считать, что площадь положительна и $s(\lambda a, b) = s(a, \lambda b) = |\lambda| \cdot s(a, b)$. Отказываясь от положительности, мы не просто упраздняем модуль¹, но помимо абсолютной величины площади учитываем также и *ориентацию* параллелограмма. На вещественной координатной плоскости \mathbb{R}^2 упорядоченные пары векторов (a, b) геометрически отличаются друг от друга тем, в какую сторону происходит кратчайший поворот, совмещающий направление первого вектора с направлением второго. Те пары векторов, для которых такой поворот происходит против часовой стрелки, называются *положительно ориентированными*, а те, для которых по часовой стрелке — *отрицательно ориентированными*. Равенство $s(-a, b) = -s(a, b)$ означает, что площадь меняет знак при смене ориентации параллелограмма на противоположную, как на рис. 1◊5.




Рис. 1◊5. Смена ориентации при смене знака.

ЛЕММА 1.3

Каждая функция площади $s : V \times V \rightarrow \mathbb{k}$ обращается в нуль на парах пропорциональных векторов², знакопеременна: $s(a, b) = -s(b, a)$ и аддитивна:

$$s(a, b + c) = s(a, b) + s(a, c) \quad \forall a, b, c \in \mathbb{k}^2. \quad (1-9)$$

Доказательство. Первые два свойства вытекают прямо из (1-7) и (1-8):

$$\begin{aligned} s(\lambda v, v) &= s(0 + \lambda v, v) = s(0, v) = s(0 \cdot 0, v) = 0 \cdot s(0, v) = 0, \\ s(a, b) &= s(a, a + b) = s(a - (a + b), a + b) = s(-b, a + b) = -s(b, a + b) = -s(b, a). \end{aligned}$$

Докажем аддитивность. Если вектор a пропорционален и вектору b , и вектору c , то он пропорционален и их сумме $b + c$. В этом случае все три площади в (1-9) зануляются. Если вектор a не пропорционален, скажем, вектору b , то a и b составляют базис, и $c = \alpha a + \beta b$ для некоторых $\alpha, \beta \in \mathbb{k}$. В этом случае левая и правая части (1-9) тоже равны друг другу:

$$\begin{aligned} s(a, b + c) &= s(a, b + \alpha a + \beta b) = s(a, (1 + \beta)b) = (1 + \beta)s(a, b), \\ s(a, b) + s(a, c) &= s(a, b) + s(a, \alpha a + \beta b) = s(a, b) + s(a, \beta b) = \\ &= s(a, b) + \beta s(a, b) = (1 + \beta)s(a, b). \end{aligned}$$

□

¹Что значительно упрощает вычисления и делает их осмысленными над любым полем \mathbb{k} .

²В частности, когда один из векторов нулевой или когда два вектора совпадают друг с другом. Свойство $s(a, a) = 0$ называют *косимметричностью*, см. упр. 1.5 ниже.

УПРАЖНЕНИЕ 1.5 (КОСОСИММЕТРИЧНОСТЬ И ЗНАКОПЕРЕМЕННОСТЬ). Функция от двух аргументов $f : V \times V \rightarrow \mathbb{k}$ называется *кососимметричной*, если $f(v, v) = 0$ для всех $v \in V$. Убедитесь, что всякая билинейная кососимметричная функция знакопеременна, а когда $1 \neq -1$ в поле \mathbb{k} , то и наоборот, все знакопеременные функции кососимметричны.

ТЕОРЕМА 1.1

На координатном векторном пространстве \mathbb{k}^2 имеется единственная с точностью до пропорциональности ненулевая функция площади. Она имеет вид $s(a, b) = c \cdot \det(a, b)$, где константа $c = s(e_1, e_2)$ равна площади стандартного базисного параллелограмма на векторах

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Доказательство. В силу аддитивности, однородности и знакопеременности функции $s(a, b)$ для любой пары векторов $a = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2$ и $b = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2$ выполняются равенства

$$s(a, b) = s(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2, \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2) = (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) s(e_1, e_2) = \det(a, b) \cdot s(e_1, e_2). \quad (1-10)$$

Поэтому все функции площади пропорциональны определителю. С другой стороны, из свойств определителя (1-2) – (1-5) вытекает, что при любом $\lambda \in \mathbb{k}$ функция $s(a, b) = c \cdot \det(a, b)$ удовлетворяет соотношениям (1-7), (1-8) и при $\lambda \neq 0$ является ненулевой. \square

СЛЕДСТВИЕ 1.2

На любом двумерном векторном пространстве V имеется единственная с точностью до пропорциональности ненулевая функция площади. Если векторы $e = (e_1, e_2)$ образуют в V базис, а векторы $a = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2$ и $b = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2$ произвольны, то¹

$$s(a, b)/s(e_1, e_2) = \det_e(a, b) = \alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1$$

для любой ненулевой функции площади s на пространстве V . \square

СЛЕДСТВИЕ 1.3

Координаты вектора $v = ax + by$ в любом базисе (a, b) двумерного векторного пространства V равны отношениям площадей $x = s(v, b)/s(a, b)$, $y = s(a, v)/s(a, b)$. \square

1.4. Аффинные² пространства. Множество \mathbb{A} называется *аффинным пространством* над векторным пространством V , если каждой упорядоченной паре точек $a, b \in \mathbb{A}$ сопоставлен вектор $\overline{ab} \in V$ так, что для любой точки $p \in \mathbb{A}$ отображение *векторизации с центром в p*

$$v_p : \mathbb{A} \rightarrow V, \quad q \mapsto \overline{pq},$$

взаимно однозначно, и для любых трёх (не обязательно различных) точек $a, b, c \in \mathbb{A}$ выполняется *правило треугольника* $\overline{ab} + \overline{bc} = \overline{ac}$.

¹Здесь и далее мы обозначаем через $\det_e(a, b)$ определитель матрицы, образованной столбцами координат векторов a, b в базисе e .

²Термин *аффинный* не должен вызывать «греческих» реминисценций — это банальная калька с английского *affine* (ассоциированный).

Иначе можно сказать, что с каждым вектором $v \in V$ связано преобразование сдвига¹

$$\tau_v : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}, \quad p \mapsto p + v,$$

со следующими двумя свойствами: для каждой пары точек $p, q \in \mathbb{A}$ имеется единственный такой вектор $v \in V$, что $p + v = q$, и для любых векторов $u, w \in V$ выполняется равенство

$$\tau_u \circ \tau_v = \tau_{u+w}.$$

Второе описание эквивалентно первому: вектор $v \in V$ со свойством $p + v = q$, о котором идёт речь во втором определении, это вектор \overline{pq} из первого определения, а правило треугольника из первого определения означает равенство $\tau_u \circ \tau_v = \tau_{u+w}$ во втором.

УПРАЖНЕНИЕ 1.6. Убедитесь в этом и выведите из определений, что: а) $\overline{aa} = 0$ для всех точек $a \in \mathbb{A}$ б) $\overline{pq} = -\overline{qp}$ для всех точек $p, q \in \mathbb{A}$ в) $\overline{ab} = \overline{dc} \Leftrightarrow \overline{bc} = \overline{ad}$ для любой четвёрки точек $a, b, c, d \in \mathbb{A}$.

ПРИМЕР 1.5 (Аффинная координатная плоскость \mathbb{A}^2)

Множество $\mathbb{A}^2 = \mathbb{A}^2(\mathbb{k})$, точками которого являются пары чисел $p = (p_1, p_2)$ из поля \mathbb{k} и точкам p, q сопоставляется вектор $\overline{pq} = q - p = (q_1 - p_1, q_2 - p_2)$ очевидно удовлетворяет предыдущим определениям. Оно называется *аффинной координатной плоскостью* над полем \mathbb{k} .

ПРИМЕР 1.6 (Приведённые квадратные трёхчлены)

Пространство \mathcal{P}_2 , точками которого являются приведённые² квадратные трёхчлены

$$p(x) = x^2 + p_1x + p_2 \in \mathbb{k}[x],$$

не является векторным пространством, поскольку сумма приведённых многочленов и произведение приведённого многочлена на число не являются приведёнными многочленами. Однако разности $q - p = (q_1 - p_1)x + (q_2 - p_2)$ приведённых трёхчленов $q = x^2 + q_1x + q_2$ и $p = x^2 + p_1x + p_2$ образуют векторное пространство $V = \mathbb{k}[x]_{\leq 1}$ многочленов степени ≤ 1 , и при произвольно зафиксированном многочлене p сопоставление $q \mapsto \overline{pq} \stackrel{\text{def}}{=} (q_1 - p_1, q_2 - p_2)$ устанавливает биекцию между \mathcal{P}_2 и V , удовлетворяющую предыдущим определениям. Поэтому пространство \mathcal{P}_2 является аффинной плоскостью над пространством многочленов степени ≤ 1 .

ПРИМЕР 1.7 (Аффинизация векторного пространства)

Из каждого векторного пространства V можно изготовить аффинное пространство $\mathbb{A}(V)$, называемое *аффинизацией* векторного пространства V . Точками пространства $\mathbb{A}(V)$ по определению являются векторы из V . В пространстве $\mathbb{A}(V)$ имеется выделенная точка 0 , отвечающая нулевому вектору, а все остальные точки продуктивно воспринимать как «концы» всевозможных «радиус-векторов» $v \in V$, отложенных от нулевой точки. Сдвиг $\tau_v : \mathbb{A}(V) \rightarrow \mathbb{A}(V)$ переводит точку a , отвечающую радиус-вектору $a \in V$, в точку $a + v$, отвечающую радиус-вектору $a + v$.

¹Или откладывание вектора v от точек $A \in \mathbb{A}$.

²Т. е. со старшим коэффициентом 1.

1.4.1. Аффинная система координат на аффинной плоскости \mathbb{A}^2 по определению состоит из произвольно взятой точки $o \in \mathbb{A}^2$ и базиса e_1, e_2 в векторном пространстве V . Тройку $(o; e_1, e_2)$ также называют *координатным репером с началом в o и базисом e_1, e_2* . Каждый координатный репер устанавливает биекцию между точками плоскости \mathbb{A}^2 и парами чисел, сопоставляющую точке $p \in \mathbb{A}^2$ координаты вектора \overline{op} в базисе e_1, e_2 . Эти координаты называются *аффинными координатами точки p относительно репера $(o; e_1, e_2)$* .

Упражнение 1.7. Убедитесь, что столбец координат вектора \overline{pq} в произвольном базисе (e_1, e_2) пространства \mathbb{k}^2 равен разности $q - p$ столбцов координат точек $q, p \in \mathbb{A}(\mathbb{k}^2)$ относительно любого репера $(o; e_1, e_2)$ на аффинной плоскости $\mathbb{A}(\mathbb{k}^2)$ вне зависимости от выбора начальной точки o этого репера.

Так, в **прим. 1.6** коэффициенты (p_1, p_2) трёхчлена $x^2 + p_1x + p_2 \in \mathcal{P}_2$ являются его координатами относительно репера $(o; e_1, e_2)$ с начальной точкой $o = x^2 \in \mathcal{P}_2$ и стандартным базисом $e_1 = x, e_2 = 1$ в векторном пространстве $\mathbb{k}[x]_{\leq 1}$.

1.4.2. Барицентры и барицентрические комбинации точек. Для любого набора точек

$$p_1, p_2, \dots, p_m$$

в аффинном пространстве \mathbb{A} и любых чисел $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m \in \mathbb{k}$ с ненулевой суммой $\mu = \sum \mu_i \neq 0$ существует единственная точка $c \in \mathbb{A}$, такая что

$$\mu_1 \overline{cp}_1 + \mu_2 \overline{cp}_2 + \dots + \mu_m \overline{cp}_m = 0. \quad (1-11)$$

В самом деле, задавшись произвольной начальной точкой $o \in \mathbb{A}$, мы можем для произвольной точки $c \in \mathbb{A}$ записать сумму из левой части (1-11), как

$$\sum \mu_i \overline{cp}_i = \sum \mu_i (\overline{op}_i - \overline{oc}) = -\mu \overline{oc} + \sum \mu_i \overline{op}_i.$$

Поэтому соотношение (1-11) выполняется для единственной точки c с радиус вектором

$$\overline{oc} = \sum_{i=1}^m \frac{\mu_i}{\mu} \cdot \overline{op}_i. \quad (1-12)$$



Рис. 1◊6. Моменты сил.

Эта точка называется *центром тяжести* или *барицентром* точек p_i с весами μ_i . Термин пришёл из механики: если поместить аффинное пространство \mathbb{A} в пространство на единицу большей размерности в качестве горизонтальной гиперплоскости Γ , как на рис. 1◊6, и приложить к

каждой точке p_i силу μ_i , направленную перпендикулярно вниз при $\mu > 0$, и вверх при $\mu < 0$, то равенство (1-11) будет означать равенство нулю суммы моментов всех этих сил относительно точки c . Если оно выполняется, плоскость Γ останется неподвижной, удерживаемая ровно за одну точку c . Так как по предыдущему точка c однозначно определяется соотношением (1-11), в котором точка o никак не участвует, точка

$$o + \overline{oc} = o + \sum_{i=1}^m \frac{\mu_i}{\mu} \cdot \overline{op}_i$$

не зависит от выбора точки o . Поэтому для любого набора точек p_1, p_2, \dots, p_m и любых констант $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m$ с суммой $\sum \mu_i = 1$, точка

$$\mu_1 p_1 + \mu_2 p_2 + \dots + \mu_m p_m \stackrel{\text{def}}{=} o + \sum_{i=1}^m \mu_i \cdot \overline{op}_i \quad (1-13)$$

не зависит от выбора начальной точки o , что и оправдывает обозначение, использованное в левой части (1-13). Точка (1-13) называется *барицентрической комбинацией* точек p_1, p_2, \dots, p_m с весами $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m$.

УПРАЖНЕНИЕ 1.8 (группирование масс). Пусть набор точек p_i с весами μ_i и набор точек q_j с весами ν_j имеют центры тяжести в точках p и q , причём обе суммы весов: $\mu = \sum \mu_i$ и $\nu = \sum \nu_j$, а также их сумма $\mu + \nu$ ненулевые. Убедитесь, что центр тяжести объединения всех точек¹ p_i и q_j совпадает с центром тяжести точек p и q , взятых с весами μ и ν . Убедитесь также, что любая барицентрическая комбинация $\sum_i y_i p_i$ точек p_i , $1 \leq i \leq m$, каждая из которых в свою очередь является барицентрической комбинацией $p_i = \sum_j x_{ij} q_{ij}$ каких-то ещё точек q_{ij} , $1 \leq j \leq k_i$, тоже представляется в виде барицентрической комбинации $\sum_{ij} z_{ij} q_{ij}$ тех же точек q_{ij} , причём если все $y_i \geq 0$ и все $x_{ij} \geq 0$, то и все $z_{ij} \geq 0$.

1.5. Прямые. Три точки a, b, p аффинного пространства называются *коллинеарными*, если векторы \overline{pa} и \overline{pb} пропорциональны. Например, это так, когда какие-то две из трёх точек совпадают друг с другом. Если $a \neq b$ пропорциональность векторов \overline{pa} и \overline{pb} означает, что при некоторых $\alpha, \beta \in \mathbb{k}$, не обращающихся одновременно в нуль, выполняются равносильные друг другу равенства

$$\beta \cdot \overline{pa} + \alpha \cdot \overline{pb} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad p = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \cdot a + \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot b.$$

В этом случае говорят, что точка p *делит* точки a и b в отношении $\alpha : \beta$. Иначе можно сказать, что точка p является барицентрической комбинацией точек a и b с весами $\beta/(\alpha + \beta)$ и $\alpha/(\alpha + \beta)$ соответственно. Каждая точка

$$p = o + \frac{\beta}{\alpha + \beta} \cdot \overline{oa} + \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot \overline{ob} = a + \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot \overline{ab} = b + \frac{\beta}{\alpha + \beta} \cdot \overline{ba},$$

коллинеарная паре различных точек $a \neq b$, однозначно определяется отношением $\alpha : \beta$, которое может принимать любые значения, отличные от -1 , ибо $\alpha = -\beta$ означает, что $\overline{pa} = \overline{pb}$, т. е. $a = b$. При этом значения

$$\alpha : \beta = 0 : 1 = 0 \quad \text{и} \quad \alpha : \beta = 1 : 0 = \infty$$

¹Если какая-то из точек p_i совпадает с некоторой точкой q_j , то их «объединение» заключается в сложении весов.

допустимы и отвечают точкам $p = a$ и $p = b$ соответственно. Равновесный барицентр¹

$$c = \frac{a+b}{2},$$

делящий a и b в отношении $1 : 1$, называется *серединой* или *центром* точек $a \neq b$.

Множество всех точек x , коллинеарных двум заданным различным точкам $a \neq b$, называется *прямой* и обозначается

$$(ab) \stackrel{\text{def}}{=} \{x = \alpha a + \beta b \mid \alpha, \beta \in \mathbb{k}, \alpha + \beta = 1\}$$

Иначе прямую (ab) в аффинном пространстве \mathbb{A} над векторным пространством V можно описать как ГМТ вида $x = a + vt$, где t пробегает основное поле \mathbb{k} , а $p \in \mathbb{A}$ и $v \in V$ суть фиксированные точка и ненулевой вектор, называемые *начальной точкой* и *направляющим вектором* или *вектором скорости* прямой (ab) .




Рис. 1◊7. Уравнение прямой.

Предложение 1.1

На аффинной плоскости проходящая через точку $a = (a_1, a_2)$ прямая с вектором скорости $v = (v_1, v_2)$ описывается в координатах (x_1, x_2) относительно произвольного репера уравнением

$$\det(x, v) = \det(a, v) \quad \text{или} \quad v_2 x_1 - v_1 x_2 = v_2 a_1 - v_1 a_2. \quad (1-14)$$

Наоборот, множество всех решений $x = (x_1, x_2)$ любого уравнения $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = \beta$ с не равными одновременно нулю коэффициентами $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{k}$ представляет собою прямую с вектором скорости, пропорциональным вектору $v = (\alpha_2, -\alpha_1)$.

Доказательство. Обозначим начало координат через o и рассмотрим векторы $\overrightarrow{ox} = (x_1, x_2)$ и $\overrightarrow{oa} = (a_1, a_2)$. Равенство $\det(v, x) = \det(v, a)$ равносильно равенству $0 = \det(v, \overrightarrow{ax}) = 0$, означающему пропорциональность векторов \overrightarrow{ax} и v . \square

Замечание 1.1. На геометрическом языке уравнение (1-14) констатирует равенство площадей жёлтого и синего параллелограммов на рис. 1◊7.

Упражнение 1.9. Напишите уравнение прямой, параллельной вектору $(5, 2)$ и проходящей через точку $(2, -3)$, а также прямой, проходящей через точки $(-3, 5)$ и $(4, -1)$, и нарисуйте на клетчатой бумаге прямые, заданные уравнениями $3x_1 + 5x_2 = -1$ и $2x_1 - 3x_2 = 5$.

Пример 1.8 (пересечение прямых)

Если левые части уравнений $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = \gamma$ и $\beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 = \delta$ не пропорциональны, то решения $x = (x_1, x_2)$ системы

$$\begin{cases} \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = \gamma \\ \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 = \delta, \end{cases} \quad (1-15)$$

¹Обратите внимание, что он существует над любым полем \mathbb{k} , в котором $2 \stackrel{\text{def}}{=}} 1 + 1 \neq 0$. Если основное поле \mathbb{k} имеет характеристику $\text{char}(\mathbb{k}) = 2$, т. е. $1 + 1 = 0$ в \mathbb{k} , то середина не определена.

суть координаты вектора $\begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix}$ в координатном пространстве \mathbb{k}^2 относительно базиса из векторов $e_1 = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix}$ и $e_2 = \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$. По правилу Крамера¹ они равны

$$x_1 = \det \begin{pmatrix} \gamma & \alpha_2 \\ \delta & \beta_2 \end{pmatrix} : \det \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \det \begin{pmatrix} \alpha_1 & \gamma \\ \beta_1 & \delta \end{pmatrix} : \det \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{pmatrix}. \quad (1-16)$$

Таким образом, прямые с непропорциональными скоростями пересекаются в единственной точке, координаты которой выражаются через коэффициенты задающих эти прямые уравнений (1-15) по формулам (1-16). Например, прямые $3x_1 + 5x_2 = -1$ и $2x_1 - 3x_2 = 5$ из упр. 1.9 пересекаются в точке с координатами $x_1 = 22/19$, $x_2 = -17/19$.

Если же левые части уравнений (1-15) пропорциональны, скажем: $\beta_1 = \lambda\alpha_1$ и $\beta_2 = \lambda\alpha_2$, то при $\delta \neq \lambda\gamma$ задаваемые этими уравнениями прямые параллельны, а при $\delta = \lambda\gamma$ они совпадают друг с другом.

Таким образом, на аффинной плоскости \mathbb{A}^2 над произвольным полем \mathbb{k} выполняются евклидовы аксиомы, описывающие взаимное расположение прямых и точек на плоскости, т. е. справедливо

Предложение 1.2

Через любые две различные точки аффинной плоскости проходит ровно одна прямая. Через любую точку, не лежащую на произвольно заданной прямой ℓ , проходит ровно одна прямая, не пересекающая прямую ℓ . \square

1.6. Треугольники. В этом разделе мы предполагаем, что $2 \stackrel{\text{def}}{=} 1 + 1 \neq 0$ в поле \mathbb{k} . Фигура, образованная на аффинной плоскости тремя неколлинеарными точками a, b, c и соединяющими их прямыми $(ab), (bc), (ca)$, называется *треугольником* Δabc . Зафиксируем какую-нибудь ненулевую функцию площади s и назовём *площадью ориентированного треугольника* Δabc половину площади ориентированного параллелограмма, натянутого на упорядоченную пару векторов $\overrightarrow{ab}, \overrightarrow{ac}$:

$$s(abc) \stackrel{\text{def}}{=} s(\overrightarrow{ab}, \overrightarrow{ac})/2. \quad (1-17)$$

Предложение 1.3

Для любого треугольника Δabc и любой точки p выполняются соотношения:

$$s(abc) = s(bca) = s(cab) = -s(bac) = -s(acb) = -s(cba) \quad (1-18)$$

$$s(abc) = s(pab) + s(pbc) + s(pca). \quad (1-19)$$

Доказательство. Для доказательства соотношений (1-18) достаточно проверить равенства

$$s(bca) = s(abc) \quad \text{и} \quad s(bac) = -s(abc),$$

которые вытекают из билинейности и кососимметричности площади параллелограмма:

$$\begin{aligned} 2s(bca) &= s(\overrightarrow{bc}, \overrightarrow{ba}) = s(\overrightarrow{ba} + \overrightarrow{ac}, \overrightarrow{ba}) = s(\overrightarrow{ac}, \overrightarrow{ba}) = s(\overrightarrow{ab}, \overrightarrow{ac}) = 2s(abc) \\ 2s(bac) &= s(\overrightarrow{ba}, \overrightarrow{bc}) = s(\overrightarrow{ba}, \overrightarrow{ba} + \overrightarrow{ac}) = s(\overrightarrow{ba}, \overrightarrow{ac}) = -s(\overrightarrow{ab}, \overrightarrow{ac}) = -2s(abc). \end{aligned}$$

¹См. лем. 1.2 на стр. 11.

Равенство (1-19) проверяется примерно так же:

$$\begin{aligned} 2s(abc) &= s(\overline{ab}, \overline{ac}) = s(\overline{ap} + \overline{pb}, \overline{ap} + \overline{pc}) = s(\overline{ap}, \overline{pc}) + s(\overline{pb}, \overline{ap}) + s(\overline{pb}, \overline{pc}) = \\ &= s(\overline{pc}, \overline{pa}) + s(\overline{pa}, \overline{pb}) + s(\overline{pb}, \overline{pc}) = 2(s(pab) + s(pbc) + s(pca)) \end{aligned}$$

□

Пример 1.9 (площади ориентированных многоугольников)

Над полем $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ формула (1-18) имеет следующее наглядное описание. Будем называть *ориентацией* треугольника выбор одного из двух возможных направлений обхода его контура. Обход против часовой стрелки, при котором треугольник остаётся слева по ходу движения, считается положительным, и площади таких треугольников положительны. Площади треугольников, обходимых по часовой стрелке отрицательны. Ориентация треугольников согласована с обсуждавшейся на 12 ориентацией параллелограммов: если выпустить из вершины треугольника два вектора по его сторонам, то ориентация натянутого на них параллелограмма совпадает с той ориентацией контура треугольника, что задаётся движением от конца первого вектора к концу второго по противоположащему выбранной вершине основанию, см. рис. 1◊8.




Рис. 1◊8. $2s(abc) = \det(\overline{ab}, \overline{ac})$.




Рис. 1◊9.

$$s(abc) = S(pab) + S(pbc) + S(pca).$$

При таких договорённостях об ориентации, формула (1-19) утверждает, что площадь ориентированного треугольника abc можно вычислять обходя его контур против часовой стрелки и складывая площади опирающихся на его стороны треугольников с вершиной в произвольно зафиксированной точке p , при этом исходящие из p векторы, используемые для вычисления площадей, всегда упорядочиваются по ходу движения. Так на рис. 1◊9 площадь Δpbc войдёт в сумму со знаком плюс, а площади Δpab и Δpac — с минусами, что и даст площадь Δabc .


Полученная формула очевидным образом обобщается на произвольную, возможно даже самопересекающуюся, как на рис. 1◊10, замкнутую ломаную $q_0q_1 \dots q_m$, у которой $q_m = q_0$. Обходя контур ломаной против часовой стрелки и складывая площади опирающихся на её звенья треугольников с вершиной в произвольно заданной точке p , мы получим сумму

$$\sum_{i=0}^{m-1} s(pq_iq_{i+1}) = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{m-1} \det(\overline{pq_i}, \overline{pq_{i+1}})$$

равную сумме взятых с надлежащими знаками площадей многоугольников, ограничиваемых этой ломаной. А именно, многоугольники контур которых обходится против часовой стрелки¹,

¹Т.е. многоугольники, лежащие слева по ходу движения вдоль ломаной.

надлежит учитывать со знаком плюс, а многоугольники, обходимые по часовой стрелке¹ — со знаком минус.



$$\text{Рис. 1} \diamond 10. \sum_{i=0}^4 s(pq_iq_{i+1}) = s(q_0q_1a) - s(baq_4) + s(bq_2q_3).$$

УПРАЖНЕНИЕ 1.10. Покажите, ориентированные площади треугольников с общей вершиной и лежащими на одной прямой основаниями относятся как эти ориентированные основания, т. е. для любых трёх коллинеарных точек a, b, c и произвольной точки p выполняется равенство $s(pab) : s(pbc) = \overline{ab} : \overline{bc}$, где справа стоит такое число $\lambda \in \mathbb{K}$, что $\lambda \cdot \overline{bc} = \overline{ab}$.

1.6.1. Барицентрические координаты. Зафиксируем на плоскости произвольный треугольник Δabc и сопоставим каждой тройке чисел $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{K}$ с суммой $\alpha + \beta + \gamma = 1$ точку

$$p = \alpha \cdot a + \beta \cdot b + \gamma \cdot c.$$

Покажем, что это сопоставление устанавливает биекцию между такого рода тройками чисел и точками плоскости. Равенство $p = \alpha \cdot a + \beta \cdot b + \gamma \cdot c$ означает, что $\overline{ap} = \beta \cdot \overline{ab} + \gamma \cdot \overline{ac}$, т. е. числа β, γ являются координатами вектора \overline{ap} в базисе $\overline{ab}, \overline{ac}$. Так как пары координат биективно соответствуют векторам, а векторы \overline{ap} — точкам p , мы имеем биекцию между точками p и произвольными парами чисел (β, γ) . Но такие пары биективно соответствуют тройкам $(\alpha, \beta, \gamma) = (1 - \beta - \gamma, \beta, \gamma)$. Числа $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{K}$ с суммой $\alpha + \beta + \gamma = 1$ называются *барицентрическими координатами* точки $p = \alpha \cdot a + \beta \cdot b + \gamma \cdot c$ относительно Δabc . Использование тройки чисел α, β, γ , связанных соотношением $\alpha + \beta + \gamma = 1$, вместо пары чисел β, γ часто оказывается более удобным, поскольку не привязано к выбору той или иной вершины в треугольнике, что позволяет видеть и использовать имеющиеся в задаче симметрии.

ПРИМЕР 1.10 (БАРИЦЕНТРИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ КАК ОТНОШЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ)

Согласно правилу Крамера², разложение произвольного вектора $\overline{ap} \in V$ по базису $\overline{ab}, \overline{ac}$ имеет вид

$$\overline{ap} = \frac{s(\overline{ap}, \overline{ac})}{s(\overline{ab}, \overline{ac})} \cdot \overline{ab} + \frac{s(\overline{ab}, \overline{ap})}{s(\overline{ab}, \overline{ac})} \cdot \overline{ac} = \frac{s(apc)}{s(abc)} \cdot \overline{ab} + \frac{s(abp)}{s(abc)} \cdot \overline{ac},$$

откуда $s(abc) \cdot \overline{pa} + s(apc) \cdot \overline{ab} + s(abp) \cdot \overline{ac} = 0$. Подставляя $s(abc) = s(pab) + s(pbc) + s(pca)$ и пользуясь равенствами $s(pab) = s(abp)$, $s(pca) = s(apc)$ и $\overline{pa} + \overline{ab} = \overline{pb}$, $\overline{pa} + \overline{ac} = \overline{pc}$, получаем

¹Т. е. лежащие справа по ходу движения.

²См. сл. 1.3 на стр. 13.

соотношение $s(pbc) \cdot \overrightarrow{pa} + s(apc) \cdot \overrightarrow{pb} + s(abp) \cdot \overrightarrow{pc} = 0$, которое означает, что барицентрическими координатами точки p относительно Δabc являются отношения площадей $\alpha = s(pbc)/s(abc)$, $\beta = s(apc)/s(abc)$, $\gamma = s(abp)/s(abc)$, т. е.

$$p = \frac{s(pbc)}{s(abc)} \cdot a + \frac{s(apc)}{s(abc)} \cdot b + \frac{s(abp)}{s(abc)} \cdot c. \quad (1-20)$$

ПРИМЕР 1.11 (ЦЕНТР ТРЕУГОЛЬНИКА)

Равновесный барицентр $o = (a + b + c)/3$ вершин треугольника Δabc называется *центром* этого треугольника. Согласно [упр. 1.8](#) точка o является центром тяжести любой из вершин и середины противоположной ей стороны, взятой с весом 2. Таким образом, o является точкой пересечения медиан Δabc и делит каждую из них в отношении 2 : 1, считая от вершины (см. [рис. 1◊11](#)). Из формулы (1-20) вытекает, что центр треугольника однозначно характеризуется как единственная точка o , для которой $s(oab) = s(abc) = s(oac)$.




Рис. 1◊11. Центр треугольника.

Ответы и указания к некоторым упражнениям

Упр. 1.1. Равенство $F(0) = 0$ получается прибавлением вектора $-F(0)$ к левой и правой части равенства $F(0) = F(0 + 0) = F(0) + F(0)$. Из равенства $0 = F(0) = F(v + (-v)) = F(v) + F(-v)$ вытекает, что $-F(v) = F(-v)$.

Упр. 1.4. Ответ: $v = y_1 w_1 + y_2 w_2$, где $y_1 = c_{11} x_1 + c_{12} x_2$, $y_2 = c_{21} x_1 + c_{22} x_2$.

Упр. 1.5. Первое следует из выкладки $0 = f(a + b, a + b) = f(a, b) + f(b, a)$, второе — из выкладки $f(v, v) = -f(v, v)$.

Упр. 1.6. Первое следует из того, что по правилу треугольника $\overline{aa} + \overline{ab} = \overline{ab}$ для любого вектора $\overline{ab} \in V$, второе — из того, что $\overline{pq} + \overline{qp} = \overline{pp} = 0$, третье — из того, что при $\overline{ab} = \overline{dc}$ имеем $\overline{bc} = \overline{ba} + \overline{ad} + \overline{dc} = -\overline{ab} + \overline{ad} + \overline{dc} = \overline{ad}$.

Упр. 1.8. Первое утверждение проверяется выкладкой

$$(\mu + \nu)^{-1}(\mu p + \nu q) = (\mu + \nu)^{-1} \left(\sum_i \mu_i p_i + \sum_j \nu_j q_j \right).$$

Второе — выкладкой

$$\sum_{i=1}^m y_i p_i = \sum_{i=1}^m y_i \sum_{j=1}^{k_j} x_{ij} q_{ij} = \sum_{ij} z_{ij} q_{ij},$$

где $z_{ij} = y_i x_{ij}$ и

$$\sum_{ij} z_{ij} = \sum_{i=1}^m y_i \sum_{j=1}^{k_j} x_{ij} = \sum_{i=1}^m y_i = 1.$$

Упр. 1.10. $s(pab) : s(pbc) = s(\overline{pa}, \overline{pb}) : s(\overline{pb}, \overline{pc}) = s(\overline{pa} - \overline{pb}, \overline{pb}) : s(\overline{pb}, \overline{pc} - \overline{pb}) = s(\overline{ba}, \overline{pb}) : s(\overline{pb}, \overline{bc}) = s(\overline{pb}, \overline{ab}) : s(\overline{pb}, \overline{pc}) = \overline{ab} : \overline{bc}$.